

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της κήλης με τοπική αναισθησία

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση με τη χρήση

πλέγματος είναι η πλέον ενδεδειγμένη, γρήγορη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση για την βουβωνοκήλη και τις άλλες μορφές κήλης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (21-24 Νοεμβρίου).

«Με την λαπαροσκοπική μέθοδο ο ασθενής αποφεύγει τις τομές που αφήνει το ανοιχτό χειρουργείο ενώ μετεγχειρητικά κινητοποιείται άμεσα και επιστρέφει σε 3-4 ημέρες στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς πόνο», τονίζει ο Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος, διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών (Κλινική Περιστερίου) ο οποίος παρουσίασε στο συνέδριο τα αποτελέσματα της κλινικής του, στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης με χρήση πλέγματος.

Όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, κατά την διάρκεια της παρουσίας των αποτελεσμάτων, μόνο όταν ο ασθενής δεν επιθυμεί να υποβληθεί σε γενική νάρκωση ή όταν λόγοι υγείας δεν το επιτρέπουν, τότε η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία μέσω μιας τομής τριών εκατοστών με χρήση πλέγματος.

[\(περισσότερα...\)](#)