


Αιμορροίδες τέλος, σε μισή ώρα...

/ Πεμπτουσία



Οι υπέρηχοι δίνουν τη λύση και οι αιμορροίδες εξαφανίζονται μέσα σε μισή ώρα, ανώδυνα και αναίμακτα. Αυτά δείχνουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου «ΤΗΔ» που παρουσιάστηκαν, πριν από λίγες ημέρες, στο ετήσιο συνέδριο των Αμερικανών Χειρουργών στο Σικάγο.

Η εκρίζωση των αιμορροίδων, που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, γίνεται πλέον πολύ γρήγορα, αναίμακτα, ανώδυνα και με απόλυτη ασφάλεια. «Η μέθοδος που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια διάσημοι χειρουργοί σε ολόκληρο τον κόσμο για την εκρίζωση των αιμορροίδων είναι η «ΤΗΔ» με τη χρήση των υπερήχων, καθώς τα αποτελέσματα της υπερέχουν όλων των άλλων μεθόδων» αναφέρει ο γενικός χειρουργός στο κ. Διαμαντής Θωμάς, που την εφαρμόζει ήδη και στη χώρα μας με μεγάλη επιτυχία.

Η εκρίζωση των αιμορροίδων γίνεται ανώδυνα, αναίμακτα και χωρίς εκτομές ιστού καθώς δεν χρησιμοποιείται πλέον χειρουργικό νυστέρι, αφού την δουλειά

του κάνουν οι υπέρηχοι.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται πάνω από την οδοντωτή γραμμή του πρωκτού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νεύρα στη περιοχή άρα δεν υπάρχει και πόνος. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου από τριάντα λεπτά μέχρι και με μία ώρα, σε προπίπτουσες αιμορροίδες 3ου ή 4ου βαθμού. Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους επιστρέφουν σπίτι του μετά από μερικές ώρες, η μπορεί να παραμείνουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία μιας ημέρας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλων επιστημονικών μελετών η εφαρμογή των υπερήχων για την εκρίζωση των αιμορροίδων θεραπεύει οριστικά και τα τρία βασικά συμπτώματα πόνος, κνησμός, αιμορραγία.

Παράλληλα έχει:

- Ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο
- Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών
- Γρήγορη (μια-δύο ημέρες) επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Με τη χρήση χειρουργικού νυστεριού ο μετεγχειρητικός πόνος είναι έντονος, με μεγάλη διάρκεια, πάνω από μία εβδομάδα και απαιτείται χρήση ισχυρών παυσίπονων. «Σε αντίθεση η μέθοδος «THD» και η εμπειρία του εξειδικευμένου χειρουργού προσφέρει άριστα και μόνιμα θεραπευτικά αποτελέσματα» προσθέτει ο κ Θωμάς.

Η δε επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες καθυστερεί περίπου δύο εβδομάδες και το ποσοστό των επιπλοκών είναι αυξημένο, όπως αιμορραγία, μολύνσεις, κακώσεις του σφιγκτήρα, ρήξη του ορθού κ.ά.,

ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ: ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι αιμορροίδες, ταλαιπωρούντο 50-70% του ενήλικου πληθυσμού και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

Επειδή η νόσος δυστυχώς ακόμη και σήμερα θεωρείται ταμπού, η πλειοψηφία των πασχόντων φτάνει στο γιατρό αργά, με προχωρημένα ενοχλήματα. Τα συμπτώματα των αιμορροίδων είναι:

- Πόνος στην περιοχή του πρωκτού
- Αιμορραγία

- Τοπικός ερεθισμός
- Κνησμός
- Ασυμπτωματική ή επώδυνη διόγκωση
- Αίσθημα ατελούς αφόδευσης

Επιστημονικές μελέτες αναφέρουν ότι πολλές είναι οι αιτίες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση των αιμορροίδων. Συγκεκριμένα:

1. Η δυσκοιλιότητα
2. Η εγκυμοσύνη,
3. Η μεγάλη ηλικία,
4. Ο έντονος βήχας
5. Η συχνή άρση βαρέων αντικειμένων σε κάποια επαγγέλματα,
6. Η κληρονομική προδιάθεση.

Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης οι επιστήμονες κατατάσσουν τις αιμορροίδες ως εξής:

1. Οι αιμορροίδες δεν είναι εμφανείς, φαίνονται μόνο με το πρωκτοσκόπιο
2. Προπίπτουν μέσα στον πρωκτό,
3. Εξέρχονται έξω από τον πρωκτό και ανατάσσονται από τον ίδιο τον ασθενή
4. Εξέρχονται και δεν ανατάσσονται χωρίς επέμβαση.