


Το ένα κάταγμα φέρνει και δεύτερο σε όσους έχουν οστεοπόρωση

/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Image not found or type unknown



από τα νέα ευρήματα θα πρέπει να γίνεται προληπτική φαρμακευτική θεραπεία για την αποφυγή δεύτερου κατάγματος λίγο μετά το πρώτο.

Ο κίνδυνος για ένα δεύτερο σοβαρό κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης είναι πιο μεγάλος, αμέσως μετά το πρώτο κάταγμα για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Νίκολας Χάρβεϊ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οστεοπόρωσης, Οστεοαρθρίτιδας και Μυοσκελετικών Παθήσεων που πραγματοποιήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας το Σεπτεμβρίου. Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 118.900 άνδρες και γυναίκες που είχαν γεννηθεί μεταξύ 1907 και 1935. Από αυτούς, οι 5.039 είχαν πάθει τουλάχιστον ένα σημαντικό κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης, ενώ οι 1.919 δύο κατάγματα. Η μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος ενός δεύτερου σοβαρού κατάγματος αυξάνεται κατά 4% για κάθε πρόσθετο έτος ηλικίας και είναι κατά μέσο όρο 41% μεγαλύτερος στις γυναίκες από ότι στους άνδρες. Χρονικά, ο κίνδυνος του δεύτερου κατάγματος είναι μεγαλύτερος αμέσως μετά το πρώτο. Αν και μειώνεται όσο περνάει ο καιρός, ο κίνδυνος ενός δεύτερου κατάγματος παραμένει υψηλότερος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ένα έτος μετά το πρώτο σοβαρό

κάταγμα εξαιτίας της οστεοπόρωσης, ο κίνδυνος ενός δεύτερου κατάγματος είναι τριπλάσιος περίπου σε σχέση με τον κίνδυνο να πάθει κανείς κάταγμα για πρώτη φορά. Μετά από δέκα έτη, ο κίνδυνος δεύτερου κατάγματος είναι διπλάσιος σε σχέση με τον κίνδυνο για πρώτο κάταγμα. Ο Χάρβεϊ ανέφερε ότι, μετά από αυτά τα ευρήματα, θα πρέπει να γίνεται προληπτική φαρμακευτική θεραπεία για την αποφυγή δεύτερου κατάγματος λίγο μετά το πρώτο. Οι ερευνητές τόνισαν ότι πολύ συχνά στα νοσοκομεία αντιμετωπίζεται ορθοπεδικά το πρώτο κάταγμα, χωρίς όμως να γίνεται η σωστή διάγνωση για την αιτία και να χορηγείται η κατάλληλη θεραπεία. Εκτιμάται ότι διεθνώς το 80% περίπου των ανθρώπων που παθαίνουν πρώτο κάταγμα, συνήθως ισχίου (γοφού), δεν διαγιγνώσκονται με οστεοπόρωση και δεν λαμβάνουν την αναγκαία φαρμακευτική θεραπεία. Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, που διοργάνωσε το συνέδριο στη Μάλαγα, προσπαθεί να επισύρει την προσοχή των γιατρών και των ασθενών στο σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr